


## När ska man använda de olika varianterna av självskattningsskalan ASRS?

Självskattningsskalan ASRS, (Adult ADHD Self-Report Scale), finns nu i journalsystemets TakeCares webbapplikation för skattningsskalan i tre olika varianter. De tre instrumenten är avsedda att användas för olika syften och det är viktigt att klinikern väljer rätt instrument.



## ASRS-screening för vuxen-ADHD

*Adult ADHD Self-Report Scale - Screener –version 1.1 (originalversion på engelska). Svensk översättning godkänd av WHO.*

### Användningsområde:

ASRS-screening för vuxen-ADHD är en självskattning avsedd att användas för att skatta frekvens av ADHD-symtom under de senaste sex månaderna hos personer  $\geq 18$  år (DSM-IV kriterium A).

Skattningsskalan är inte diagnostisk utan endast avsedd att användas i screeningsyfte.

### Tidsåtgång:

5 min

### Tolkning:

$\geq 4$  av 6 svarsalternativ över den definierade cut-off-gränsen: Symtom på vuxen-ADHD kan föreligga (DSM-IV-kriterium A) varför fortsatt diagnostisk utredning kan vara motiverad. Obs! För ADHD-diagnos krävs att även DSM-IV-kriterierna B-E bedöms vara uppfyllda.

0-3 av 6 svarsalternativ över den definierade cut-off-gränsen: Mindre sannolikt att symtom på vuxen-ADHD föreligger (DSM-IV-kriterium A).

---

## ASRS utredning

*Adult ADHD Self-Report Scale-Självrapportsskala –version 1. Svensk version godkänd av WHO.*

**Användningsområde:**

ASRS-aktuell symtomnivå är en självskattning avsedd att användas för att skatta aktuell nivå av ADHD-symtom under *de senaste 6 månaderna* hos personer  $\geq 18$  år (DSM-IV-kriterium A för ADHD).

Skattningsskalan består av två delskalor, ouppmärksamhet (DSM-IV-kriterium A1 för ADHD) respektive hyperaktivitet/impulsivitet (DSM-IV-kriterium A2 för ADHD). Skattningsskalan är inte diagnostisk utan avsedd att användas som .....

---

## ASRS aktuell symtomnivå

*Adult ADHD Self-Report Scale-Självrapportsskala –version 1.1. Svensk version godkänd av WHO, anpassad för behandlingsuppföljning.*

**Användningsområde:**

ASRS-aktuell symtomnivå är en självskattning avsedd att användas för att skatta aktuell nivå av ADHD-symtom under *den senaste veckan* hos personer  $\geq 18$  år (DSM-IV-kriterium A för ADHD).

Skattningsskalan består av två delskalor, ouppmärksamhet (DSM-IV-kriterium A1 för ADHD) respektive hyperaktivitet/impulsivitet (DSM-IV-kriterium A2 för ADHD). Skattningsskalan är inte diagnostisk utan avsedd att användas som ett mått på aktuell symtomnivå i samband med behandlingsuppföljning.

---

**Mer information** om skalorna finns i de tolkningsdokument som sammanställts för respektive instrument. Dessa finns dels på psykiatristod.se , dels i TakeCares webbapplikation för skattningsskalor.

*April 2013,*

*Ylva Ginsberg, Prima Vuxenpsykiatri, & Mattias Agestam, SLSO:s verksamhetsstöd eHälsa.*